

## Denne side er udskrevet fra [www.akvariefisk.dk](http://www.akvariefisk.dk)

### Taxonomi

**Artsnavn (latinsk navn):** Hypancistrus zebra L046

**Populærnavn (dansk navn):** Zebramalle

**Familie (latin):** Loricariidae

**Type:** Ferskvand, Sugemaller

**Opdager (beskrevet af):** Isbrücker & Nijssen, 1991

**Førstegangso opdræt i DK:**

### Levested

**Verdensdel:** Sydamerika.

**Biotop (beskrivelse af regionen):** Klippebeklædt vandløb med masser af huler og sprækker med stærk cirkulation.

### Udseende

**Størrelse:** 7 - 10 cm.

**Form:** Aflang og flad.

**Farve:** Sorte og kridhvite striber på hele kroppen.

**Kønsforskel:** Hannens forreste brystfinne er tykkere end hunnens. Smaller hoved end hunnen. På kønsmodne hanner kommer der små pigge på de forreste brystfinner.

**Varianter:**

### Behov

**Dekorationer:** Stenformationer med mange rum, hvor fisken kan gemme sig. samt en masse huler eks. af skiffer eller keramik.

**Adfærd:** En sky, men meget territorial fisk. Bør holdes alene, eller sammen med andre rolige fisk.

**Social:** Fredelig. Der kan dog være en del kampe mellem hannerne.

**Foder:** Animalsk mad, som f.eks. myggelarver(anbefales ikke af lgb). jbl novo tab, tetra tabimin, afskallet artemia.

### Vandet

**Akvariestørrelse:** 100

**Niveau:** Bund zone

**Vandcirkulation:** Meget kraftig

**Min. pH:** 5,0

**Max. pH:** 8,0

**Min. dH:** 5

**Max. dH:** 15

**Min Temperatur:**

**Max Temperatur:**

**Belysning:** Svagt - Medium

### **Formering**

**Ynglebiologi:** Æglæggende huleleger. Hannen passer æg og unger.

**Drægtighed:** Æggene klækkes efter ca. en uge. Ti dage efter klækningen kan fodring begynde.

**Leg:**

**Øvrigt omkring opdræt og yngel:** Skulle efter sigende være let at opdrætte, når fiskene er blevet kønsmodne.

### **Øvrige oplysninger**

**Generel beskrivelse**

**Forfatter:** Maria Emmer, opdateret d. 27.8.08 af lgb



Få flere informationer på [www.akvariefisk.dk](http://www.akvariefisk.dk)