

Denne side er udskrevet fra www.akvariefisk.dk

Taxonomi

Artsnavn (latinsk navn): Aequidens metae
Populærnavn (dansk navn): Twin spot flag cichlid
Familie (latin):
Type: Cichlider, Syd Amerika

Opdager (beskrevet af):

**Førstegangso
opdræt i DK:**

Levested

Verdensdel:

Biotop (beskrivelse af regionen):

Udseende

Størrelse:

Form:

Farve: Gul og grønlig

Kønsforskel:

Varianter:

Behov

Dekorationer:

Adfærd:

Social:

Foder: Cichldesticks, Flagefoder, Myggelarver (Røde)

Vandet

Akvariestørrelse: 180

Niveau:

Vandcirkulation:

Min. pH: 6.5

Max. pH: 7

Min. dH:

Max. dH:

Min Temperatur:

Max Temperatur:

Belysning:

Formering

Ynglebiologi:

Drægtighed:

Leg: Metae lægger æg på en rod eller en flad sten. Først gør parret stenen ren og derefter begynder legen. Æggene klækkes efter ca 3 dage og flyttes derefter til en lille hule el.lign. Ungerne er fritsvømmende efter ca 10-12 ialt. Hunnen forsvaret æggene mens hannen holder opsyn med resten af reviret. Forældrene passer på ynglen i ca 5-6 uger. På dette tidspunkt har ungerne nået en størrelse af ca 2,5 cm.

**Øvrigt omkring
opdræt og yngel:**

Øvrige oplysninger

Generel beskrivelse Udbredelse: Colombia i Sydamerika. Blev første gang fanget i Rio Meta-floden. Deraf navnet.
Endemisk til få floder i Colombia.
Den lever i svagt rindende bække og flodafsnit.

Metae er en forholdsvis fredelig cichlide. Der kan forekomme revirkampe så sørg for gode gemmesteder til de jagede. Dog ender kampene sjældent med dødeligt udfald.

Metae kan blive op til 20 cm hvis forholdene tillader det men typisk bliver de 15-18 cm.

A. metae bør holdes i 200L og opefter. Metaen danner par og kan derfor med fordel købes som en flok ungfisk og lade dem danne par. Den graver ikke det store og kan fint lade dine planter i akvariet være i fred.

Kønsforskel: Hannen bliver større og får spidsere og længere anal- og rygfinne.

Forfatter: Lasse Christiansen



Få flere informationer på www.akvariefisk.dk